

PAPÉIS AVULSOS  
DO  
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA  
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL.

---

ESTUDO SOBRE PERNAS DE ADELOCEPHALIDAE.  
(Lepidoptera)

p o r

José Otacílio Filho.

(Com 15 estampas e 1 figura no texto)

ORIGEM E OBJETIVOS DO PRESENTE ESTUDO.

Este estudo, feito sobre patas de lepidópteros da família *Adelocephalinae* (1), nasceu logo após o que publiquei em 1938, confrontando com BOUVIER, 1931.

No referido trabalho nas "Considerações gerais", critiquei alguns senões no trabalho de BOUVIER, 1931. Passaram-me despercebidas, no entanto, algumas afirmações feitas por BOUVIER sobre as patas de *Adelocephalidae* (*Syssphingidae* como chama sem razão, BOUVIER).

Passo a transcrever alguns trechos do trabalho de BOUVIER, 1931. Leio página 12:

*Tableau des Syssphingidés.*

- A — Tibias de certaines pattes armées d'une ou plusieurs épines au bout distal (fig. 10 et 17).
- B — Celle armature rédnite à une épine qui occupe l'angle antéro-externe du tibia antérieur (fig. 10), ce tibia avec une épiphyse à longs poils qui est rudimentaire ou nulle chez la ♀. Etc...

---

(1) — O nome *Adelocephalidae* será justificado em trabalho meu a sair brevemente.

1 — *Anisota* Huebner.

B' — L'armature comprend: aux tibias antérieures une épine externe et une interne, aux tibias moyens, qui sont très courtes, une antero-externe et deux antero-internes (fig. 17), etc...

2 — *Giacomellia* Bouvier.

A' — Tous les tibias inermes, à peu près aussi longs que le tarse, les antérieures avec épiphyse dans les deux sexes (fig. 6).

Seguem-se contidos na subdivisão principal A' os gêneros:

3 — *Syssphinx* Huebner.

4 — *Eacles* Huebner.

5 — *Schaniella* Bouv.

6 — *Ciltheronia* Huebner.

À pag. 15, ao tratar de *Anisota*:

"Tibias des pattes antérieures armées distalement d'une forte épine externe, parfois, d'une interne bien plus réduite; etc..."

À pag. 27, ao tratar dos caracteres do gênero *Syssphinx*:

"Chez les adultes (fig. 26, p. 35) par le front étroit, triangulaire, à lobe inférieur saillant en avant comme dans les *Giacomellia*, par les pattes dont les tibias sont tous inermes, plus ou moins de la longueur du tarse, les antérieures avec une épiphyse à longs poils toujours développée dans les deux sexes".

À pag. 193, ao tratar dos caracteres da sub-família *Arsenurinae* (erradamente chamada *Rhescyntinae*, por BOUVIER):

"Les tibias sont inermes, l'épiphyse (fig. 76, p. 219) des antérieures presque toujours une comme dans *Ciltheronia* et *Schaniella*".

Já anteriormente, BOUVIER, 1930, p. 553, dizia:

"Ainsi compris le genre *Syssphinx* se rapproche des grands Cératocampidés et diffère des autres par ses tibias dépourvus d'épines; etc..."

Na página 554, do mesmo trabalho, a tratar da definição do gênero *Giacomellia* dizia:

"Mais combien différentes sont les pattes! Ici, contrairement à ce que l'on observe dans tous les autres *Ceratocampidés*, les tibias des pattes antérieures, et surtout ceux des pattes de la deuxième paire, sont bien plus courts que les torses, les premiers sont armés de deux fortes épines distales et les seconds de trois, deux internes et l'autre externe. Ces dernières sont plus longues que l'article lui-même qui est dilaté et plus court que le premier article tarsien."

Todos os grifos são meus.

#### O PRESENTE ESTUDO TEM POR OBJETIVOS:

- a) Corrigir erros nos trabalhos de BOUVIER, sobre patas de *Adelocephalidae*, contidos em resumo nas citações acima grifadas.
- b) Dar figuras copiadas do natural, por projeção da preparação, de patas de *Adelocephalidae*, nas sub-famílias *Adelocephalinae* e *Arsenurinae*.
- c) Chamar a atenção, para a morfologia interessante das patas dos gêneros *Paradacmoula* e *Dysdacmoula*.
- d) Mostrar serem as duas sub-famílias citadas, possnidoras de patas típicas para cada uma delas.
- e) Mostrar, quiçá pela primeira vez, uma característica morfológica, do quarto segmento tarsal nas fêmeas de *Adelocephalidae*, característica extensível à super-família *Saturnioidea* e que parece ser uma das boas definições desta super-família.

#### ERROS DE BOUVIER

(Ver as partes grifadas das transcrições acima).

Pode parecer estranho refira-me eu especialmente aos erros de BOUVIER. Não me move o desejo de menoscar a obra fecunda deste naturalista. Sendo porém, êle, o último a contribuir, com grandes trabalhos sobre a família em apreço e com toda a certeza o autor seguido pelas novas gerações, é meu dever mostrar publicamente, serem os seus estudos morfológicos insuficientes e muitas vezes errados. Êste meu dever cresce de vulto, ao se saber que eu e alguns colegas brasileiros, pretendemos remodelar a parte sistemática da família *Adelocephalidae*. Sistemática ao meu ver é ciência e como tal, procurarei fazer as coisas cientificamente.

Relifico os erros de BOUVIER com as afirmações seguintes:

- a) As patas das espécies dos gêneros (tomadas no senso de BOUVIER, 1931) *Syssphinx*, *Eacles*, *Schausella*, *Ciltheronia*, não tem tôdas as tibiás inertes. As tibiás do segundo e terceiro par de patas em todos os gêneros acima são armadas com 2 esporões (1), situados no ápices das tibiás. Estes esporões são chamados  $e_1$ ,  $e_2$  nas Estampas 1 a 5 do presente trabalho. Comprimentos aproximados destes esporões, em milímetros, no quadro abaixo:

| Espécies                                     | Estampas | 2.º par                      | 3.º par                      |
|----------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Anisota virguleusis</i>                   | 1        | $e_1 = 0,19$<br>$e_2 = 0,24$ | $e_1 = 0,27$<br>$e_2 = 0,31$ |
| <i>Glacomella</i>                            | 1        |                              | $e_1 = 0,42$<br>$e_2 = 0,51$ |
| <i>Syssphinx mollia</i>                      | 2        | $e_1 = 0,54$<br>$e_2 = 0,63$ | $e_1 = 0,69$<br>$e_2 = 0,69$ |
| <i>Eacles imperialis</i><br><i>magnifica</i> | 3        | $e_1 = 0,81$<br>$e_2 = 0,87$ | $e_1 = 0,87$<br>$e_2 = 0,96$ |
| <i>Schausella jancira</i>                    | 4        | $e_1 = 0,60$<br>$e_2 = 0,66$ | $e_1 = 0,66$<br>$e_2 = 0,66$ |
| <i>Ciltheronia regalis</i>                   | 5        | $e_1 = 1,00$<br>$e_2 = 1,00$ | $e_1 = 1,00$<br>$e_2 = 1,14$ |

Já no meu trabalho de 1938, figurei (est. 1, figs. 5, 6), as tibiás médias e posteriores de *E. Lauroi* com os esporões  $e_1$  e  $e_2$ .

- b) As patas das espécies dos gêneros, *Paradaemonia*, *Copiopteryx* (*Eudaemonia* em BOUVIER, 1931), *Arsenura* (*Rhesynthis* em BOUVIER, 1931), *Rhesynthis* (*Machaerosema* em BOUVIER, 1931), *Loxolonia*, *Dysdaemonia*, não tem tôdas as tibiás inertes, como afirma BOUVIER, 1931, pág. 193. (Ver transcrições acima).

(1) — *Spur* dos ingleses — Ver Snodgrass, 1935, pp. 56-57.



Nesta sub-família a afirmação de BOUVIER ainda é *mais absurda*, pois os esporões apicais das tíbias do 1.º e 3.º par de patas são maiores do que na sub-família anterior. Ainda há mais, nos gêneros *Paradaemonia* e *Dysdaemonia* as tíbias do 3.º par de patas têm *dois pares* de esporões como se vê nas Estampas 10 e 11. O quadro abaixo dá as dimensões em milímetros dos esporões das tíbias nos gêneros nele determinados:

| Espécies                     | Estampas | 2.º par                      | 3.º par                                                        |
|------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Copiopteryx semiramis</i> | 6        | $e_1 = 1,00$<br>$e_2 = 1,47$ | $e_1 = 1,17$<br>$e_2 = 1,01$                                   |
| <i>Arsenura hercules</i>     | 7        | $e_1 = 1,80$<br>$e_2 = 2,50$ | $e_1 = 1,86$<br>$e_2 = 2,70$                                   |
| <i>Rhescyntis martii</i>     | 8        | $e_1 = 1,05$<br>$e_2 = 1,86$ | $e_1 = 1,08$<br>$e_2 = 2,04$                                   |
| <i>Loxolomia serpentina</i>  | 9        | $e_1 = 1,05$<br>$e_2 = 1,65$ | $e_1 = 1,29$<br>$e_2 = 1,65$                                   |
| <i>Dysdaemonia boreas</i>    | 10       | $e_1 = 0,93$<br>$e_2 = 1,32$ | $e'_1 = 0,45$<br>$e'_2 = 0,99$<br>$e_1 = 1,26$<br>$e_2 = 1,53$ |
| <i>Paradaemonia pluto</i>    | 11       | $e_1 = 1,05$<br>$e_2 = 1,59$ | $e'_1 = 1,14$<br>$e'_2 = 1,17$<br>$e_1 = 1,26$<br>$e_2 = 2,01$ |

- c) O gênero *Anisota*, assim como qualquer outro dos gêneros estudados no presente trabalho, *não tem esporões* (épine distal de BOUVIER) *nas tíbias anteriores*, como afirma BOUVIER nas transcrições acima. Também o gênero *Giacomellia* não foge à regra e *as tíbias anteriores não tem esporões*. (*dois!* segundo BOUVIER).

Os espinhos (épines) de BOUVIER, parece-me serem *apófises das tíbias formadas na região da articulação tíbio-tarsal*. É a própria parede da tíbia que se alonga, na citada região, dando a aparência de espinho. Estes alongamentos das tíbias aparecem designados pela *letra a* nas figuras do presente trabalho. Este alongamento é pronunciado principalmente em *Anisota* (est. 1, figs. 4, 5, 6; est. 12, fig. 4). Mas ele aparece também, nas tíbias dos segundos e terceiros pares ao lado dos verdadeiros esporões  $e_1$  e  $e_2$ . Ver principalmente a figura 4 da estampa 12, da fêmea de *A. stigma*.

Em *Giacomellia* (est. 1 figs. 1, 2, 3 e 7) a tíbia anterior tem também dois alongamentos como em *Anisota*. A tíbia do segundo par, característica do gênero, não tem 3 espinhos como disse BOUVIER. Tem (vêr figs. 2 e 7 da est. 1) dois esporões,  $e_1$  e  $e_2$ , sendo  $e_2$  muito mais largo e comprido que  $e_1$ .


O outro espinho de BOUVIER é uma grande *apófise (a) da articulação tíbio-tarsal, análoga às estudadas em Anisota*. Reproduzo na estampa 1, figura 8, uma fotografia tirada de BOUVIER, 1931, da tíbia média de *Giacomellia*. Nota-se ser a *figura de BOUVIER errada*. Os esporões das tíbias, aqui no caso os espinhos (épines) de BOUVIER, são como se sabe, *processos móveis multicelulares da parede da tíbia, com uma CAMADA de células epidérmicas de formação*. Ora, as apófises "a" disctidas não são *processos móveis*, não têm a membrana que lhes dá a mobilidade característica. Nas figuras aparecem as inserções com clareza.

As apófises "a" aparecem ainda com algum desenvolvimento nos gêneros *Eacles* (est. 3, figs. 2 e 3) e *Citheronia* (est. 5, fig. 3).

#### EXPLICAÇÃO DAS FIGURAS

##### *Parte geral:*

As patas representadas, vão do *femur* ao *pretarsus*, não disento nem represento a *coxa* e o *trochanter*. As patas pertencem ao *lado direito dos insetos e estão todas na mesma posição em relação aos fêmures e tíbias*. Os tarsómeros e pretarsos apresentam posições di-



ferentes devida à sua extrema mobilidade na preparação. Mas isto em nada dificulta as comparações e até pelo contrário, pode auxiliar a compreensão de certas estruturas mais complicadas, como a do *prelarsus*.

Os fêmures das patas médias em todos os gêneros examinados são maiores em comprimento do que o fêmures das outras patas.

De modo que é fácil separar nos gêneros e espécies estudadas, as patas médias das posteriores, as únicas que se prestam a confusão.

Como o número de espécies por mim examinadas, está longe de ser completo, pode a regra acima não ser absoluta. É preciso pois separar sempre a pata média da posterior e verificar com cuidado a regra citada.

As tíbias das patas posteriores, são, em geral, maiores em comprimento do que as tíbias das outras patas. Achei-as iguais à da pata média em *Sysphlux mollua*, nos quadros dados a seguir.

Tôdas as tíbias em todos os gêneros, *erecto* (?) a tíbia anômala do 2.<sup>o</sup> par em *Glaconellia* apresentam junto da região basal, oposto à região condilar um órgão (ob) que denomino *órgão basal da tíbia*. Este órgão, aparece em várias posições nas figuras do presente trabalho e tem mais ou menos a mesma forma nos diferentes gêneros. Possuem sempre alguns pêlos que aparecem nas figuras. Parece ser este órgão um órgão sensitivo, talvez um *sensillum scolopothorum* da classificação de SNOGNIASS, 1935, p. 514 — 515. Este órgão, como se vê nas figuras, está situado numa *depressão da tíbia*, talvez numa *depressão timpânica*. Este órgão basal já aparece representado no meu trabalho de 1938.

Os esporões das tíbias indicados  $c_1$  e  $c_2$  apresentam-se sempre com  $c_1$  menor que  $c_2$  no máximo igual. Isto se vê claramente nas figuras e nos quadros dados anteriormente no presente trabalho.

Os pré-tarsos apresentam a mesma estrutura. Para estrutura geral do *prelarsus* ver as figuras 1 e 2 da estampa 13.

Nestas figuras aparecem em grande escala os pré-tarsos de fêmeas de alguns *Adelocephalidae*. Notam-se os componentes típicos dos pré-tarsos na família em estudo.

O apodema tendão (1) do músculo flexor das unhas que vai até a tíbia e fêmur onde fica situado o dito músculo, tendão figurado apenas em parte. A placa *unguitractor* (utr) presa por um lado ao apodema tendão e por outro aos *pulvilli* (pv) e por meio de uma membrana ao *arolium* (ar), tudo isto pela face ventral e pela face dorsal às unhas (*unques* ou *ungehla*). O *unguitractor* está coberto de processos escamosos como aparecem nas figuras, talvez órgãos sensitivos, *sensilla squamiformia* da classificação de SNOGNIASS, 1935.

Essas escamas seguem-se às *pezes*, em muito menor número pela membrana que vai até ao *arolium*, aparecendo em grande quantidade bem na base do *arolium*.

As vezes segue-se ao *unguitractor* um esclerito denominado *planta* (pl) (fig. 3, escl. 12), esclerito que pode aparecer ou não, em certas palas de uma mesma espécie.

O *arolium* apresenta aspectos diferentes e um estudo comparativo mais profundo mostrará qual a sua importância na sistemática. Todos apresentam, em comum, uma *placa basal* (arp) com uma *alça ventral* e fortemente quitinizada. Esta alça de base quitinizada vê-se com clareza em alguns desenhos em que o *arolium* aparece de lado; ver escl. 7, fig. 2; escl. 6, fig. 3; escl. 5, figs. 1, 2, 3; escl. 4, fig. 2; escl. 3, fig. 2, escl. 2, figs. 1, 2 e 3.

Na *face dorsal* do *pretarsus* notam-se as *unhas* (n) e preso à parte membranosa que vai ter ao *arolium* nota-se o *empodium* (emp) com uma base da qual parte um espinho dirigido *dorsalmente* entre as unhas.

As unhas articulam-se no *unguifer* (unf), peça apical e ventral do último tarsômero imediatamente acima do *unguitractor* do *pretarso*. A forma do *unguifer* é em geral a que aparece nas figuras, com o aspecto de cogumelo. Os últimos tarsômeros possuem no ápice *cerdas* (c) em número de duas em geral podendo haver exceções.

Em todas as palas desde o fêmur até o último segmento do tarso há processos designados por "s" nas figuras e que me parecem serem *processos unicelulares setae* em SNODGRASS, 1935, p. 57. Não desenhei essas *setae* nos fêmures e foram omitidas em alguns outros desenhos. Na subfamília *Arsenurinae*, além das *setae* há outros processos mais curtos e grossos, designados por "e" nas figuras, *processos estes que permitem a primeira vista separar as duas subfamílias*; ver as estampas 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Serão *espinhos*, isto é, processos multi-celulares ou serão *setae* modificados?

Parecem-me *verdadeiros espinhos* de origem diferente das *setae*.

Todas as líbias do primeiro par possuem *epiflises* (ep), processos estes reduzidos em *Anisota*, principalmente nas fêmeas.

Nos desenhos do presente trabalho não é possível comparar as formas das *epiflises* por não estarem todas na mesma posição. São, em geral, depois de fervedas na polassa e livres dos pêlos externos, cobertas por uma camada de pêlos *curtos* e *finos*, dando um aspecto aveludado ao órgão em questão.

Esses pêlos não foram desenhados na maioria das figuras, mas a sua disposição geral aparece claramente nos desenhos das estam-



das 3 e 5. A parte das epífises em contacto com a tíbia é desnuda e mais quitinizada como pode-se ver nas estampas citadas.

### PARTE ESPECIAL:

Nesta parte tocarei apenas sem certos pontos ainda não vistos anteriormente.

Estudarei somente agora, patas de machos, pois, falarei a seguir sobre as fêmeas.

As espécies escolhidas, foram principalmente as de fácil classificação, para não haver dúvidas na ordem sistemática. Por falta de material não foi desenhado o género *Grammopelta*, falta esta, que esperamos sanar em breve num trabalho separado.

#### Gênero *ANISOTA* Hübner, 1820 (1)

(Est. 1, figs. 4, 5 e 6)

Darei apenas um quadro das dimensões dos diversos segmentos das patas, em milímetros, medidos até o final das inserções que aparecem nas preparações por transparência, e que nos desenhos são vistas pontilhadas. Medidas em *Anisota virginensis* (Drury, 1773), macho, exemplar número 227, preparação com o mesmo número na minha coleção.

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 2,50               | 2,60            | 2,50                |
| Tíbia        | 2,10               | 2,30            | 2,40                |
| Tarsômeros 1 | 0,75               | 0,75            | 0,90                |
| 2            | 0,45               | 0,45            | 0,57                |
| 3            | 0,39               | 0,36            | 0,39                |
| 4            | 0,33               | 0,33            | 0,32                |
| 5            | 0,51               | 0,63            | 0,66                |

— Tibias medidas até o ápice do maior processo designado a no desenho.

(1) — As datas de Hübner são dadas de acôrdo com Hemming.

Gênero **GIACOMELLIA** Bouvier, 1930

(Esl. 1, figs. 1, 2, 3, 7 e 8)

Gênero caracterizado pelas *tíbias das patas médias*. *Tíbia muito curta e larga*, em relação às demais tíbias da família; dois esporões  $e_1$  e  $e_2$ , *anormais*, talvez homólogos dos outros homônios na família. O esporão  $e_2$  *largo e grande* (0,90 mm.), apical. O esporão  $e_1$  *fino e pequeno* (0,60 mm.), inserido aproximadamente no meio da tíbia. A situação destes esporões é bem diversa dos seus homônios que são sempre apicais. Esta tíbia com uma grande apófise *a*, que Bouvier chamou de espinho. Femur da pata média muito largo em relação aos outros da família. Na figura 8 damos uma cópia da mesma tíbia como foi representada por Bouvier, 1931. Como se vê a figura de Bouvier está *errada*. No quadro abaixo medidas em milímetros dos comprimentos dos diversos segmentos das patas, com as tíbias medidas até à ponta das respectivas apófises *a*.

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 2,80               | 2,85            | 2,67                |
| Tíbia        | 2,31               | 1,44            | 2,82                |
| Tarsômeros 1 | 1,53               | 1,89            | 1,32                |
| 2            | 0,84               | 0,84            | 0,84                |
| 3            | 0,66               | 0,63            | 0,63                |
| 4            | 0,45               | 0,45            | 0,51                |
| 5            | 0,66               | 0,60            | 0,60                |

Medidas em *Giacomellia bilineata* (Burmeister, 1878), macho, exemplar número 194 da coleção Am, no Museu Nacional.

Gênero **SYSSPHINX** Hübner, 1819

(Esl. 2, figs. 1, 2 e 3)

Figuro as patas de *Eacles magnifica* Walker, 1855. Exemplar macho, número 176, preparação com o mesmo número, ambos na minha coleção. Quadro das medidas dos comprimentos, em milímetros, dos segmentos das patas.

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 6,78               | 7,35            | 6,10                |
| Tíbia        | 5,70               | 5,82            | 5,82                |
| Tarsômeros 1 | 2,10               | 2,40            | 3,12                |
| 2            | 1,02               | 1,08            | 1,26                |
| 3            | 0,90               | 0,90            | 0,99                |
| 4            | 0,75               | 0,78            | 0,71                |
| 5            | 1,35               | 1,41            | 1,29                |

Gênero *EACLES* Hübner, 1819

(Est. 3, figs. 1, 2, e 3)

Figuro as patas de *Eacles magnifica* Walker, 1855. Exemplar macho, número 176, preparação com o mesmo número, ambos na minha coleção. Quadro das medidas dos comprimentos, em milímetros, dos segmentos das patas.

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 7,65               | 8,25            | 7,95                |
| Tíbia        | 6,30               | 6,24            | 7,11                |
| Tarsômeros 1 | 2,61               | 3,18            | 3,84                |
| 2            | 1,35               | 1,50            | 1,74                |
| 3            | 1,05               | 1,20            | 1,35                |
| 4            | 0,81               | 0,96            | 0,99                |
| 5            | 1,74               | 1,74            | 1,65                |

Gênero *SCHAUSIELLA* Bouvier, 1930

(Est. 4, figs. 1, 2 e 3)

Neste gênero, pelo menos no exemplar figurado, as cerdas e do último tarsômero apresentam-se em número variado. Nas figuras da estampa 4 contamos 6 para a pata anterior, 6 para a média (3 aparecem na figura, visto o tarsômero de lado) e 8 para a posterior. O fato importante ao meu ver, é existirem mais de duas cerdas, pois nos outros gêneros por mim examinados a *regra geral é duas*. Exemplar figurado de *Schausiella jaucha* (Schaus, 1892), macho, número 237 na minha coleção, número igual para a preparação.

Quadro das medidas análogo aos outros já feitos

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 6,18               | 7,05            | 6,51                |
| Tibia        | 5,40               | 5,25            | 6,48                |
| Tarsômeros 1 | 2,07               | 2,31            | 3,00                |
| 2            | 1,05               | 1,20            | 1,38                |
| 3            | 0,90               | 0,96            | 1,05                |
| 4            | 0,66               | 0,81            | 0,87                |
| 5            | 1,35               | 1,38            | 1,32                |

Gênero *CITHERONIA* Hübner, 1819

(Est. 5, figs. 1, 2 e 3)

Exemplar figurado e medido, número 236 da minha coleção e preparação de igual número. Espécie *Citheronia regalis* (Fabricius, 1793), macho.



|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 7,50               | 8,58            | 7,71                |
| Tíbia        | 6,39               | 6,30            | 7,65                |
| Tarsômeros 1 | 2,31               | 2,64            | 3,21                |
| 2            | 1,20               | 1,38            | 1,68                |
| 3            | 0,96               | 1,08            | 1,29                |
| 4            | 0,78               | 0,91            | 1,05                |
| 5            | 0,81               | 1,81            | 1,77                |

Gênero **COPIOPTERYX** Duncan, 1841

(Est. 6, figs. 1, 2 e 3)

Espécie figurada e medida *Copioteryx semiramis* Cramer, 1775, macho, exemplar 253 da minha coleção e preparação de igual número.

Quadro com medidas em milímetros, como nos anteriores.

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 6,39               | 7,17            | 6,81                |
| Tíbia        | 2,64               | 6,15            | 6,60                |
| Tarsômeros 1 | 1,98               | 2,37            | 2,71                |
| 2            | 1,05               | 1,05            | 1,21                |
| 3            | 0,87               | 0,90            | 0,96                |
| 4            | 0,69               | 0,75            | 0,78                |
| 5            | 1,11               | 1,26            | 1,26                |

## Gênero ARSENURA Duncan, 1841

(Esl. 7, figs. 1, 2 e 3)

Espécie figurada e medida *Arsenura hercules* Walker, 1855, macho. Exemplar número 193 da minha coleção. Preparação com o mesmo número.

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 9,39               | 11,04           | 9,60                |
| Tibia        | 7,62               | 8,40            | 9,48                |
| Tarsômeros 1 | 2,94               | 3,81            | 4,80                |
| 2            | 1,65               | 1,74            | 2,04                |
| 3            | 1,38               | 1,50            | 1,62                |
| 4            | 1,05               | 1,11            | 1,23                |
| 5            | 1,98               | 2,07            | 2,04                |

## Gênero RHESCYNTIS Hübner, 1819

(Esl. 8, figs. 1, 2 e 3)

Espécie figurada e medida *Rhescyntis martii* (Perty, 1834). Exemplar número 195 da minha coleção. Preparação de igual número.

O quadro abaixo dá as medidas dos comprimentos dos segmentos das palas, como os anteriores.

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 6,48               | 7,68            | 7,08                |
| Tibia        | 5,34               | 5,85            | 7,11                |
| Tarsômeros 1 | 2,55               | 2,88            | 3,39                |
| 2            | 1,29               | 1,35            | 1,59                |
| 3            | 1,08               | 1,08            | 1,17                |
| 4            | 0,81               | 0,90            | 0,96                |
| 5            | 1,29               | 1,29            | 1,38                |

Gênero *LOXOLOMIA* Maassen, 1869

(Est. 9 figs. 1, 2 e 3)

Espécie medida e figurada *Loxolomia serpentina* Maassen, 1869. Exemplar macho, número 186 da minha coleção. Preparação de igual número. Quadro abaixo, de medidas, como os anteriores.

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 6,30               | 6,60            | 5,85                |
| Tíbia        | 4,86               | 5,25            | 5,94                |
| Tarsômeros 1 | 2,04               | 2,37            | 2,91                |
| 2            | 1,02               | 1,08            | 1,44                |
| 3            | 0,81               | 0,81            | 0,99                |
| 4            | 0,69               | 0,69            | 0,75                |
| 5            | 1,26               | 1,26            | 1,35                |

MORFOLOGIA ESPECIAL NOS GÊNEROS *Paradoemonia* BOUVIER, 1925*E Dysdocmonia* HÜNNER, 1819

Ao examinar as patas de *Paradoemonia pluto* (Westwood, 1853) e *Dysdocmonia boreas* (Cramer, 1775) notámos uma particularidade muito interessante nas tíbias do terceiro par. Esta particularidade consiste em ter as tíbias em questão 2 pares de esporões,  $e_1$  e  $e_2$  apicais normais e  $e'_1$  e  $e'_2$  situado a cerca de 1,65 milímetros do ápice em *D. boreas* e a cerca de 1,60 milímetros em *P. pluto* (Ests. 10 e 11, fig. 3). Estes esporões secundários só encontrei-os até agora nestes dois gêneros da família em estudo. Os esporões  $e'$  de *D. boreas* são bem diferentes em comprimento  $e'_1$  com 0,45 e  $e'_2$  com 0,99 mm.; isto é  $e'_2=2,2e'_1$  ao passo que em *P. pluto*  $e'_1=1,14$  mm. e  $e'_2=1,17$ , isto é, quasi iguais, porém ainda  $e'_2 > e'_1$ . Estes esporões conservam a mesma particularidade geral dos esporões  $e$ , qual a de ser os esporões  $e_1$  menores que os  $e_2$ , no mínimo iguais. Quadro das medidas dos comprimentos dos segmentos das patas, como nos anteriores. Em *Dysdocmonia boreas* (Cramer, 1775), exemplar macho, número 192 na minha coleção e preparação de mesmo número.

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 6,30               | 7,35            | 6,60                |
| Tibia        | 4,95               | 5,55            | 6,36                |
| Tarsômeros 1 | 2,22               | 2,82            | 3,33                |
| 2            | 1,14               | 1,20            | 1,44                |
| 3            | 0,90               | 0,93            | 1,08                |
| 4            | 0,75               | 0,78            | 0,81                |
| 5            | 1,23               | 1,35            | 1,26                |

Em *Paradocmonia pluto* (Westwood, 1853), exemplar macho, número 184 na minha coleção e preparação de mesmo número

|              | <i>P. anterior</i> | <i>P. média</i> | <i>P. posterior</i> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Femur        | 6,51               | 7,35            | 6,60                |
| Tibia        | 5,31               | 5,55            | 6,75                |
| Tarsômeros 1 | 2,52               | 2,82            | 3,60                |
| 2            | 1,17               | 1,23            | 1,50                |
| 3            | 0,90               | 0,90            | 1,08                |
| 4            | 0,75               | 0,78            | 0,87                |
| 5            | 1,14               | 1,23            | 1,20                |



## SÔBRE O PENÚLTIMO TARSÔMERO DAS PATAS ANTERIORES, NAS FÊMEAS

O penúltimo tarsômero das patas anteriores das fêmeas de *Adelocephalidae* apresentam um aspecto bem diferente do mesmo tarsômero nos machos. Nas figuras das estampas 12 e 13 e na estampa 14, aparece êste fato claramente. O penúltimo tarsômero das patas anteriores apresenta um aspecto de *crecente* com cada ponta armada de um grande *espinho tarsal* designado *et* nas figuras (1). Correspondentes a estes espinhos o último tarsômero apresenta na sua base uma região *l*. Esta região apresenta um *rebalço* mais *piloso* que o resto do tarsômero no qual parece *inserir-se* os *espinhos tarsais* do penúltimo tarsômero.

Esta morfologia particular das patas anteriores, *parece ser exclusiva da super-família Saturniidae*. Encontrei a mesma morfologia em outros gêneros desta super-família, como *Automeris*, *Rothschildia* e outros. Um estudo futuro mais aprofundado mostrará até que ponto êste caráter morfológico das fêmeas poderá elucidar questões de sistemática e filogenia. Nas explicações das estampas estão discriminadas os gêneros e espécies representados.

## SÔBRE A DIFERENCIAÇÃO DAS SUB-FAMÍLIAS ADELOCEPHALINAE E ARSENIURINAE PELAS PATAS

A sub-família *Adelocephalinae* J. Oiticea F., 1939 com os gêneros: *Anisota* Hübner, 1820; *Glacometilia* Bouvier, 1930; *Syssphinx* Hübner, 1819; *Adelocephala* Boisduval; *Eacles* Hübner, 1819; *Schauinsella* Bouvier, 1930; *Citheronia* Hübner, 1819; e a sub-família *Arsenurinae* Jordan, 1922 com os gêneros *Copiopteryx* Duncan, 1841; *Arsenura*, Duncan, 1841; *Rhesocentis* Hübner, 1819?; *Loxolomia* Maassen 1869; *Grammopepla* Rothschild, 1907 (sob reserva); *Paradoemonta* Bouvier, 1925; *Dysdarmonia* Hübner, 1819, distinguem-se à primeira vista pelas patas.

Os caracteres diferenciais nas patas são:

1 — Os tarsômeros de *Arsenurinae* tem espinhos designados *e* nas figuras do presente trabalho, espinhos que não existem em *Adelocephalinae*.

2 — A relação entre os comprimentos das tíbias das patas médias e posteriores e os comprimentos dos esporões e das respectivas tíbias é maior em *Adelocephalinae* do que em *Arsenurinae*.

(1) — Na fig. 1 da est. 14 aparece uma anomalia. Há 2 espinhos *et* de um dos lados do aludido tarsômero.

3 --- A relação  $\frac{e_2}{e_1}$  dos esporões das tíbias é maior em *Arsenurinae* do que em *Adelocephalinae*. Isto aliás nota-se logo a um simples olhar das figuras, pois os esporões  $e_2$  e  $e_1$  de *Adelocephalinae* são quasi iguais e muito diferentes em *Arsenurinae*.

Passo a estudar os caracteres 2 e 3 com mais detalhes.

$$\text{Relação } \frac{t}{e_2}$$

Chamo  $t$  o comprimento de uma tíbia e  $e_2$  do respectivo esporão.

$$\text{Escrevo } \frac{t}{e_2} = m$$

$$(t) \text{ e daí: } t = m e_2$$


Represento graficamente, em relação a um sistema cartesiano ortogonal, as variações de  $t$  em relação a  $e_2$  para as patas médias (Est. 15, fig. 1) e para as patas posteriores (Est. 15, fig. 2).

Deixo de lado, nas patas médias, a tíbia anômala de *Giacomella*, no qual os esporões  $e_2$  e  $e_1$  parecem não homólogos dos seus homônimos nos outros gêneros. Sendo  $m$  o coeficiente angular das retas representadas pela equação (1), para um maior valor de  $m$  corresponde um maior ângulo das retas (1) com o eixo das abscissas.

Nos gráficos 1 e 2 da estampa 15, as retas  $a$ ,  $b$ , foram traçadas respectivamente para o máximo e o mínimo de  $m$  em *Adelocephalinae*.

As retas  $c$ ,  $d$ , foram traçadas respectivamente para o máximo e o mínimo em *Arsenurinae*. Nota-se portanto, com um simples olhar, no gráfico, a verdade do caráter 1:  $m$  é maior em *Adelocephalinae* do que em *Arsenurinae*.

Relação  $\frac{e_2}{e_1}$  — Esta relação é maior para *Arseurinae*.



Retas *a* e *b* máximo e mínimo de  $\frac{e_2}{e_1}$  para *Arseurinae*.

Retas *c* e *d* idem para *Adelocephalinae*.

Chega a ser quasi igual em *Glacomella* e *Loxoloma* nas patas posteriores, assim mesmo é um pouco maior em *Loxoloma*. Don um gráfico, est. 15, para as patas posteriores, analogamente ao que fiz para a relação  $\frac{t}{e_2}$ . Estes estudos gráficos são evidentemente um *cusalo* e só poderão adquirir um caráter imutável quando um número muito maior de espécies das sub-famílias em estudo for examinado. Penso, no entanto, terem algum significado morfológico sistemático e quiçá filogenético.

## BIBLIOGRAFIA CITADA

BOUVIER, E. L.

1930 — Quelques observations sur les Papillons Saturnioïdes de la famille des Cératocampidés. C. R. Acad. Sci., 190: 552-555

1931 — Etude des Saturnioïdes Normaux. Famille des Syssphingides. Mem. Acad. Sci. Inst. de France, 60; 2me. série.

HEMMING, F.

1937 — A bibliographical account of the entomological works of Jacob Hübner, etc., vols. 1 e 2

OITICICA FILHO, J.

1938 — Uma nova espécie do gênero *Eacles* Hübner, 1820 (Lepid. Syssphingidae) Mem. Inst. Osw. Cruz, 33 (2): 281-290, 9 ests., 39 figs.

SNODGRASS, R. F.

1935 — Principles of Insect Morphology

## EXPLICAÇÃO DAS ESTAMPAS

## Estampa 1 (1)

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, médias e posteriores de *Glacomella billneata*. Macho.

Figs. 4, 5, 6 — Idem de *Anisota virginensis*. Macho.

Fig. 7 — Tibia da pata média de *Glacomella billneata*. Macho.

Fig. 8 — Cópia da figura dada por Bouvier 1931, da tibia da pata média de *Glacomella billneata*.

---

(1) — Todos os desenhos feitos pelo autor, em tôdas as estampas.



## Estampa 11

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, médias e posteriores de *Paradaemonia pluto*. Macho.

## Estampa 12

## Patas de fêmeas

Fig. 1 — Tarsômero 4 e 5 e pratarso de *Schausietta janelra*.

Fig. 2 — Idem de *Anisota stigma*.

Fig. 3 — Idem de *Syssphinx molina*.

Fig. 4 — Pata de *Anisota stigma*.

(Escala A para a fig. 4. Escala B para as figs. 1, 2 e 3)

## Estampa 13

## Patas de fêmeas

Fig. 1 — Tarsômeros 4 e 5 e pratarso de *Citheronia regalis*.

Fig. 2 — Idem de *Eactes magnifica*.

## Estampa 14

## Patas de fêmeas

Fig. 1 — Patas, a começar da íibia, de *Rhescyntis martii*. Exemplar 249 da minha coleção.

Fig. 2 — Idem de *Dysdaemonia boreas*. Exemplar 251 da minha coleção.

Fig. 3 — Idem de *Paradaemonia pluto*. Exemplar 252 da minha coleção.

## Estampa 15

## Gráficos explicados no texto

Abreviações: A — *Anisota*

C — *Citheronia*

Co — *Copiopteryx*

D — *Dysdaemonia*

E — *Eactes*

G — *Giacomettia*


L — *Loxolomia*

P — *Paradaemonia*


R — *Rhescyntis*

S — *Syssphinx*

Se — *Schausietta*



8



7




























1 mm

*Paradeniopsis pluto*



1 mm.

